



DIFCOR®

DIFCOR® è un fungicida sistemico contenente difenoconazolo, principio attivo appartenente alla famiglia chimica dei triazoli (meccanismo d'azione FRAC 3). Ha un ampio spettro d'azione ed è efficace contro un gran numero di malattie fungine. Rapidamente assorbito dalle colture, si diffonde negli organi coperti dal trattamento.

COMPOSIZIONE Difenoconazolo puro 23,6% (250 g/L)

FORMULAZIONE Concentrato emulsionabile

INTERVALLO DI SICUREZZA 7 gg per pomodoro; 14 gg per pomacee e drupacee, carota, sedano rapa, rafano, topinambur, pastinaca, prezzemolo, salsefrica, rapa, rutabaga, bietola rossa, cavolfiori, broccoli ed altri cavoli ad infiorescenza, cavolo verde e cinese ed altri cavoli a foglia, sedano; 21 per vite, barbabietola, cicoria, indivia, cavoli a testa, cavoli di bruxelles; 56 gg per colza.

N° DI REGISTRAZIONE 17112 del 17.04.2018

CONFEZIONE L 1

INDICAZIONI DI PERICOLO **PERICOLO**
H302 - H304 - H319 - H373
H410 - EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	NOTE
 Vite d'avino e datavola	Oidio, Black rot, Brenner	0,12	Massimo 2 applicazioni per anno. È consentita una terza applicazione per il controllo del Black rot.
 Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nashi	Ticchiolatura (<i>Venturia spp.</i>)	0,015 L/hL	Massimo 3 applicazioni per anno.
 Pesco, Nettareino, Albicocco	Monilia, Oidio	0,02 L/hL	Massimo 2 applicazioni per anno.
 Susino, Giuggiolo	Monilia	0,02 L/hL	Massimo 3 applicazioni per anno.
 Carota, Sedano Rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Salsefrica	Alternaria, Oidio	0,5	Massimo 3 applicazioni per anno.
 Rapa, Rutabaga	Alternaria, Micosferella	0,5	Massimo 3 applicazioni per anno.
 Barbabietola da zucchero e da foraggio	Ruggine	0,5	Massimo 2 applicazioni per anno.
 Bietola rossa	Ruggine	0,5	Massimo 2 applicazioni per anno.
 Cicoria, Indivia (inclusa Indivia Belga)	Ruggine, Alternaria, Oidio	0,5	Massimo 1 applicazione per anno.
 Asparago	Ruggine, Stemphylium	0,5	Trattamenti dopo la raccolta dei turioni. Massimo 3 applicazioni per anno.
 Cavolfiori, Broccoli ed altri Cavoli ad infiorescenza, Cavolo Verde, Cavolo Cinese ed altri Cavoli a foglia	Alternaria, Micosferella	0,5	Massimo 3 applicazioni per anno.

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	NOTE
 Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles	Alternaria, Micosferella	0,5	Massimo 3 applicazioni per anno.
 Sedano	Septoria	0,5	Massimo 3 applicazioni per anno.
 Pomodoro	Alternaria, Sclerotinia, Botrite	0,5	Massimo 3 applicazioni per anno.
 Leguminose da seme (erba Medica, Trifoglio, Veccia, Favino, ecc), in campo e serra	Ruggine	0,5	Massimo 3 applicazioni per anno.
 Culture da seme (Carota, Lattuga, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Cavoli, Spinacio, Rapa, Bietola rossa, Fagioli, Piselli, Cetriolo, Zucchini, Melone, Viola, Aster, Garofano, Crisantemo, Lupini, Piselli dolci, ecc) in campo e serra	Ruggine, Stemphiliium, Oidio, Septoria	0,5	Massimo 2 applicazioni per anno.
 Colza	Phoma, Alternaria, Sclerotinia	0,5	Massimo 2 applicazioni per anno.
 Rosa	Oidio, Ruggini, Ticchialatura	0,1 L/hL	Massimo 1 applicazione per anno.
 Alberi ed Arbusti Ornamentali	Oidio, Marciume Nero, Ruggine, Cercospora, Monilia, ecc.	0,5	Massimo 2 applicazioni per anno.

- Attività sistemica
- Ampio spettro d'azione
- Efficacia due ore dopo l'applicazione

